


Zapylanie upraw polowych - najlepsze praktyki

Warunki środowiskowe


Trzmiele Natupol Trio zapylają najskuteczniej w temperaturach 8 - 30°C.

Wprowadzenie na uprawę

- Ule Natupol Trio należy rozstawić równomiernie w całej uprawie.



- Jeżeli w uprawie znajdują się ule z pszczołami, zaleca się, aby Natupol Trio był rozmieszczony w odległości nie mniejszej niż 100 metrów.



- Ule powinny stać poziomo (pochylenie może spowodować wyciekanie pożywki ze zbiorników pod ulami).



- Nie stawiać ula bezpośrednio na ziemi, lecz na małym podwyższeniu: skrzynka, paleta etc.



- Ul warto dodatkowo zabezpieczyć siatką przed zwierzętami oraz przymocować lub dociążyć, aby nie przesunął się podczas silnych podmuchów wiatru.



Koppert

Natupol Trio



pudełko z karbowanego tworzywa sztucznego z izolacją termiczną

3 kolonie (każda z królową)

Ule w uprawie



koppert.pl

Ochrona ula



- Ule Natupol Trio należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Zapewnienie skutecznego zacielenia na górze i po bokach ula może znacząco pomóc trzmielom podczas wysokich temperatur.



Zmiana miejsca w uprawie

- Przed przeniesieniem ula Natupol Trio w inne miejsce należy zadbać, by wszystkie trzmiele wróciły do ula. W tym celu przesunąć plastikowe zasuwę ula w dół tak, aby jeden z dwóch otworów był zamknięty.
- Po dwóch godzinach można zamknąć oba otwory ula. Najlepiej zrobić to przed wieczorem ok. 17-tej.
- Wieczorem, około godziny 20-tej można przenieść ule na nowe miejsce.
- Rano otworzyć ule, aby trzmiele mogły rozpocząć obloty nowego miejsca.
- Nie należy przenosić ula w nocy, gdyż zdarza się, że trzmiele nocują na uprawie. Jeśli przeniesiemy ul, który był otwarty (w pozycji wlotowej i wylotowej) do końca dnia, trzmiele powracające rano z uprawy nie znajdą ula.

Ustawienia ula



- Otwór wlotowy i wylotowy zamknięty



- Otwór wlotowy otwarty, otwór wylotowy zamknięty



- Otwór wlotowy i wylotowy otwarty

Stosowanie środków chemicznych

- Trzmiele są wrażliwe na wiele środków chemicznych. Aktualne i szczegółowe informacje o wpływie środków chemicznych oraz o odpowiednich środkach zapobiegawczych są dostępne w aplikacji Koppert One.
- Przed zastosowaniem szkodliwych dla trzmieli środków chemicznych należy zamknąć ule i usunąć je z uprawy. Zamknięcie uli na okres dłuższy, niż 2 dni spowoduje brak pożywienia w kolonii i zwiększoną śmiertelność larw. Można zakupić pyłek do dokarmiania trzmieli w okresie przetrzymywania uli w zamknięciu lub gdy nie ma jeszcze kwitnących kwiatów.



ZESKANUJ KOD QR

aby przejść do aplikacji Koppert One



Koppert

koppert.pl

Koppert Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 7
62-070 Dąbrowka

tel.: 61 842 38 89
info@koppert.pl
www.koppert.pl

